

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/187955>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Медицина

-

маршрутизации

Анализ оценки состояния пациентов показал, что при поступлении у 17 мужчин (42,5%) состояние оценивалось в 3 балла, у 23 пациентов (57,5%) – в 4 балла.

Оценка состояния у женщин распределилась следующим образом: 3 балла – 8 (20,0%), 4 балла – 31 (77,5%), 5 баллов – 1 (2,5%).

Данные о состоянии пациентов при поступлении по шкале реабилитационной маршрутизации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка состояния пациентов при поступлении по ШРМ

Балл Результат оценки

мужчины женщины

абс % абс %

3 17 42,5 8 20,0

4 23 57,5 31 77,5

5 0 0 1 2,5

Всего 40 100 40 100

Данные результаты отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Оценка состояния пациентов при поступлении

Из рисунка 1 видно, что при поступлении состояние большинства пациентов (57,5% мужчин и 77,5% женщин) оценивалось как выраженное ограничение процессов жизнедеятельности.

В состоянии, оцениваемом как ограничение жизнедеятельности, умеренное по своей выраженности, поступили 42,5% мужчин и 20,0% женщин; у 2,5% пациенток состояние при поступлении было оценено как грубое нарушение процессов жизнедеятельности.

Состояние пациентов по шкале реабилитационной маршрутизации оценивалось также при выписке пациентов после проведения курса кардиореабилитации.

Данные о состоянии пациентов при выписке по шкале реабилитационной маршрутизации представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка состояния пациентов при выписке по ШРМ

Балл Результат оценки

мужчины женщины

абс % абс %

2 15 37,5 5 12,5

3 25 62,5 33 82,5

4 0 0 2 5,0

Всего 40 100 40 100

Данные наглядно отражает рисунок 2.

Рис. 2. Оценка состояния пациентов при выписке

Анализ состояния пациентов-мужчин после проведения кардиореабилитации показал, что у 15 пациентов (37,5%) состояние оценивалось как состояние легкого ограничения жизнедеятельности, у 25 пациентов (62,5%) – как состояние ограничения жизнедеятельности, умеренного по своей выраженности.

Состояние пациенток после проведения кардиореабилитации было следующим: состояние легкого ограничения жизнедеятельности (2 балла) определялось у 5 пациенток (12,5%), состояние ограничения жизнедеятельности, умеренного по своей выраженности – у 33 пациенток (82,5%), выраженное

ограничение жизнедеятельности – у 2 пациенток (5,0%).

Данные по изменению состояния пациентов после проведения кардиореабилитации представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристика состояния пациентов до и после проведения программы кардиореабилитации (ШРМ)

Оценка в баллах Количество пациентов

мужчины женщины

до после до после

абс % абс % абс % абс %

2 0 0 15 37,5 0 0 5 12,5

3 17 42,5 25 62,5 8 20,0 33 82,5

4 23 57,5 0 0 31 77,5 2 5,0

5 0 0 0 0 1 2,5 0 0

Итого 40 100,0 40 100 40 100 40 100

Динамику состояния пациентов до проведения кардиореабилитации и после ее проведения по шкале реабилитационной маршрутизации отражает рисунок 3.

Рис. 3. Динамика состояния пациентов

Из таблицы 1 и рисунка 3 видно, что состояние большинства пациентов (62,5% мужчин и 82,5% женщин) после проведения программы кардиореабилитации оценивается как состояние ограничения жизнедеятельности, умеренное по своей выраженности. У 37,5% мужчин и 12,5% женщин состояние после проведения программы реабилитации расценивалось как состояние легкого ограничения жизнедеятельности, у двух пациенток (5,0%) после проведения программы кардиореабилитации состояние рассматривалось как выраженное ограничение жизнедеятельности.

Следует также отметить, что при поступлении у одной пациентки (2,5%) состояние было оценено как грубое нарушение процессов жизнедеятельности, что не отмечалось у пациентов-мужчин.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/187955>