

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurosovaya-rabota/332865>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Математический анализ

Введение 3

1. Теоретическая часть 5

1.1. Понятие функции нескольких переменных 5

1.2. Предел и непрерывность функции нескольких переменных 7

1.3. Частные производные первого порядка и высших порядков 9

1.4. Полный дифференциал функции двух переменных и его приложение в приближенных вычислениях 11

1.5. Экстремумы функции нескольких переменных 12

1.6. Условный экстремум 14

1.7. Наибольшее и наименьшее значения функции 15

1.8. Производная по направлению 17

1.9. Градиент 18

1.10. Касательная плоскость. Нормаль к поверхности 19

1.11. Формула Тейлора 20

2. Практическая часть 21

2.1. Приложение функции многих переменных в задачах физики 21

2.1.1. Волновое уравнение 21

2.1.2. Уравнение теплопроводности 24

2.2. Приложение функции многих переменных в задачах химии (задача диффузии) 26

2.3. Приложение функции многих переменных в задачах экономики 27

2.3.1. Поиск максимума прибыли 27

2.3.2. Анализ производственной функции Кобба-Дугласа 29

Заключение 30

Список источников 31

Введение

В основе решения различных задач прежде всего лежит математическая модель. Именно математические модели содержат в себе уравнения, неравенства вместе с переменными и параметрами, над которыми и производятся различного рода математические операции. Уравнения и неравенства, как способ описания или отождествления различных процессов, может содержать необязательно одно неизвестное или один параметр. Данный фактор определяется, прежде всего, размерностью задачи. Причем, параметры и переменные математической модели далеко не всегда равноправны. То есть некоторые величины вносят существенный вклад в поведение модели и оказывает наиболее существенное воздействие на результат моделирования, другие же могут оказывать влияние на уровне погрешностей. В таких случаях уместно говорить о предельных переходах.

При этом различным математическим уравнениям, неравенствам можно ставить в соответствие и графическую интерпретацию. Фактически, поиск корней уравнения или неравенства сводится к нахождению искомого значений неизвестных x_1, x_2, \dots, x_n при заданных параметрах $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{(n+1)}$ для которых это уравнение/неравенство является истиной. Если же изобразить некую числовую плоскость и нанести на нее различные значения переменных x_i , то для данного значения переменной искомое уравнение или неравенство будет принимать какое-либо значение. При этом если же некоторое значение переменной x_i является корнем, выражение становится истинным. Нетрудно понять, что понятие "плоскость" легко трансформируется в понятие "пространство", подразумевая, что числовое соответствие может быть представлено 2D и 3D области.

При приобретении конкретной практической применимости эти понятия приобретают название система координат. На сегодняшний день известно множество систем координат, и наиболее употребимые: цилиндрическая, сферическая, реже тороидальная, но, пожалуй, самая используемая прямоугольная или декартова. Причем пространство R^2 называется евклидовой плоскостью, а R^3 называется евклидовым пространством [1, стр. 214].

Все системы координат равноправны, но удобней вести рассуждения в рамках плоской (2D), если речь идет о функции одной переменной, прямоугольной системы координат, где вводятся простые понятия осей координат, которые являются взаимно перпендикулярными. То есть одна из осей направлена по горизонтали (пусть название данной оси x), а другая направлена вертикально (пусть название данной оси y).

При этом ось x будем называть осью абсцисс, а ось y – осью ординат. Зависимость значений y на соответствующей оси ординат от значений x на соответствующей оси абсцисс будем называть функцией (или функциональной зависимостью), если каждому значению x соответствует одно значение y [2, стр. 194]. В таком случае все множество значений x (аргументов) для данной функции называют областью определения функции, а соответствующие значения y называют областью значений функции [2, стр. 194]. При этом, если речь идет о функции многих переменных, то логично рассуждать о многомерном пространстве, размерность которой определяется количеством переменных. Ясно, что размерность выше трехмерного человеку представить сложно, поэтому дальнейшие рассуждения предполагается вести относительно 3D-пространства, для которого характерны 3 переменные: независимые переменные x, y и зависимая переменная $z=f(x, y)$.

Целью данного исследования является определение основных прикладных и теоретических областей применимости функции нескольких переменных.

Теоретическая часть

Понятие функции нескольких переменных

Понятие функция в математике означает взаимно обратное соответствие между множествами. Функция подразумевает наличие независимой переменной (пусть будет переменная x), а также зависимой переменной (пусть будет переменная y). Закон, по которому определяется соответствие между зависимой и независимой переменной называется функциональной зависимостью и математически может быть представлена в виде выражения:

$$y=f(x)$$

Однако зависимых переменных, оказывающих влияние на независимую переменную, может быть сколь угодно много. В таких случаях говорят о функции нескольких переменных. И тогда:

$$y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Функция $y \in E$ (определенная вещественным множеством чисел) n переменных относит к упорядоченному множеству значений переменных $x_1, x_2, \dots, x_n \in D$ (также определенная вещественным множеством чисел). Область определения функции n переменных (то есть область возможных для этой функции значений аргумента) называется множеством $D=D(f)$, а множество $E=E(f)$ называется областью значения этой функции [2, стр. 194].

В дальнейшем, не умаляя общности будет подразумеваться рассмотрение функции двух переменных (ФДП). И тогда искомая функциональная зависимость будет определяться как:

$$z=f(x, y),$$

где z – функция двух переменных, а x, y – независимые переменные (аргументы) данной функции.

В большинстве приложений переменные x, y или x_1, x_2, \dots, x_n, y обозначают физические объекты или величины, так что соответствующие соотношения описывают физические закономерности [3, стр. 98-99]. Например, $y=x_1 x_2$, если x_1, x_2 и y соответственно означают напряжений, силу тока и мощность в простом электрическом контуре.

Множество $\Gamma=\{(x, y, z) \in R^3; (x, y) \in D, z=f(x, y)\}$ называется графиком функции многих (двух) переменных $z=f(x, y)$.

То есть график функции $z=f(x, y)$ геометрически является некоторую поверхность в 3D-пространстве R^3 . На рисунке показан пример трехмерной поверхности, которая определяется зависимостью $z=\sqrt{(1-x^2-y^2)}$ (определенной в $D=\{(x, y); x^2+y^2 \leq 1\}$).

Рисунок 1.1. Пример графика функции двух переменных $z=\sqrt{(1-x^2-y^2)}$

Графиком этой функции в пространстве декартовых координат является сфера единичного радиуса.

Предел и непрерывность функции нескольких переменных

Определение предела функции может быть записано в двух основных формулировках [1, стр. 222], [2, стр. 198].

Формулировка 1: Число A – это предел ФДП $z=f(x, y)$ в некоторой точке $M_0(x_0, y_0)$, если для \forall

последовательности $\{M_n(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$, которая сходится к точке $M_0(x_0, y_0)$, соответствующая последовательность $\{f(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty}$ значений этой функции сходится к искомому числу A .

Другими словами, из $n \rightarrow \infty: M_n \rightarrow M_0$, следует, что $f(x_n, y_n) \rightarrow A$.

В данном случае принята запись:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = A$$

Формулировка 2: Число A называется пределом ФДП $z=f(x, y)$ в точке $M_0(x_0, y_0)$, если для $\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0$:

$\forall x$ и y , которые удовлетворяют неравенству

$$0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta,$$

выполняется следующее условие:

$$|f(x, y) - A| < \epsilon.$$

Здесь искомая точка $M(x, y)$ принадлежит δ -окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$ и не совпадает с ней.

Координаты точки $M(x, y)$ могут быть представлены в виде $x=x_0+\Delta x$, $y=y_0+\Delta y$. В таком случае предел можно записать в виде:

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = A$$

Подобным же образом формулируется понятие предела функции при стремлении точки к бесконечности [2, стр. 194].

При этом, если существует предел функции двух переменных в точке $M_0(x_0, y_0)$ и равен значению $z_0(x_0, y_0)$, то данная функция называется непрерывной в данной точке, и справедливо равенство:

1. Быкова О. Н., Колягин С. Ю., Кукушкин Б. Н. Практикум по математическому анализу. Учебное пособие, Изд-во «Прометей», Москва, 2011, 274 с.
2. Геворкян П. С. Высшая математика. Основы математического анализа., 2004, 240 с.
3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. Изд-во «Наука», Москва, 1973, 831 с.
4. Тимошенко С. П., Янг Д. Х., Уивер У. Колебания в инженерном деле. Изд-во «Машиностроение», 1985, 470 с.
5. Ершова А. Г., Левин М. Н. Математические модели теплопроводности в твердых телах. Методическое пособие к лабораторному практикуму по дисциплине «Численные методы». Киров, 2011, 70 с.
6. Бекман И. Н. Математика диффузии. Учебное пособие. Изд-во «Онтопринт», Москва, 399 с.
7. Матвеева Л. Д., Рудый А. Н. Математический анализ функции нескольких переменных. Курс лекций для студентов инженерно-технических и экономических специальностей. Минск, 2019, 70 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/332865>